



Gamme Auxiliaires de lutte biologique pour jardins

BIOTOP

L'effet Nature

Cible	Produits préconisés	Pour protéger	Dose utilisation en fonction infestations et dimensions des végétaux	Période d'utilisation, conditions spécifiques	Mode d'utilisation
				Voir notice du produit	
Pucerons 	Coccibelle® LARVES (<i>Harmonia axyridis</i>), souche non volante	plantes basses et petits arbustes, isolés ou en petits massifs et haies	60 larves pour 2 à 6 m ² 250 larves pour 7 à 25 m ²	Dès l'apparition des pucerons	Répartir de préférence près des foyers de pucerons  
	Coccifly® LARVES (<i>Adalia bipunctata</i>)	petites plantes et arbustes, isolés ou en petits massifs et haies	80 larves pour 1 à 4 m ² ou 1 à 2 arbustes		
	Coccifly® ADULTES (<i>Adalia bipunctata</i>)	arbres et grands arbustes , isolés ou en massifs et haies denses	1 à 2 arbres		
Aleurodes, Acariens 	Calpop® ADULTES <i>Macrolophus melanotoma</i> (<i>caliginosus</i>)	plantes potagères (tomate, aubergine, poivron, courgette...)	50 adultes , de 10 à 50 m ²	- De préférence, en préventif, après la bonne implantation des végétaux - Température > 18-20°C	Libérer les insectes sur les plantes 
Aleurodes 	Calpop® LARVES <i>Macrolophus melanotoma</i> (<i>caliginosus</i>)		80 larves , de 8 à 16 m ²	En présence des ravageurs	
Acariens 	Phytoseiulus <i>Phytoseiulus persimilis</i>	plantes potagères (aubergine, haricot, poivron, fraisier, melon...) et ornementales (rosier, gerbera...)	500 acariens , de 25 à 100 m ²	- En présence des ravageurs - Température > 20°C, - Hygrométrie élevée	
Psylles 	Popsyl® <i>Anthocoris nemoralis</i>	poiriers, mimosas, oliviers, lauriers sauce	50 adultes , de 1 à 2 arbres	En présence des ravageurs	
Thrips, Aleurodes, Acariens 	Vespop® <i>Frankliniopsis vespiformis</i>	plantes potagères (concombre, courgette, haricot, poivron,...), fruitières (fraise) et ornementales (plante tropicale, rosier...)	50 adultes , de 5 à 10 m ²	- En présence des ravageurs - Température > 20-22°C	
Mouches des terreaux 	Nematodes Sf (<i>Steinernema feltiae</i>)	diverses plantes potagères et ornementales (cyclamen, hortensia, géranium...)	5 millions pour 10 m ² 25 millions pour 50 m ²	- Toute l'année - Température du sol > 12°C - Sol à maintenir humide	Diluer les nématodes dans l'eau et épandre sur le sol 
Vers blancs Otiorrhynques, hannetons horticolaes 	Nematodes Hb (<i>Heterorhabditis bacteriophora</i>)	plantes ornementales (rhododendron, rose, thuya, cyclamen, bégonia...) et fruitières (fraises)		- De mars à juin et de août à octobre - Température du sol > 12°C - Sol à maintenir humide	
Vers gris Chenilles de noctuelles Tipules, Courtillères 	Nematodes Sc (<i>Steinernema carpocapsae</i>)	plantes potagères (salade, pomme de terre, tomate, oignon, ...)		- De mai à septembre - Température du sol > 12°C - Sol à maintenir humide	
Limaces 	Nematodes Ph (<i>Phasmarhabditis hermaphrodita</i>)	diverses plantes potagères et ornementales	12 millions pour 40 m ² 30 millions pour 120 m ²	- En présence des limaces (printemps, automne) - Température du sol > 5°C - Sol à maintenir humide	